

Caldex Vet

Injectable Solution

Composition:

Each ml contains		
Calcium Gluconate	BP	208 mg
Magnesium Hypophosphite	Ph. grade	50 mg
Dextrose	BP	200 mg
Boric Acid	BP	42 mg

Indications:

Milk fever in cows and in the treatment of animals associated with hypocalcaemia, hypomagnesaemia, hypophosphataemia and hypoglycaemia; also effective for the treatment of ketosis.

Dosage and Administration:

Caldex Vet is slowly administered by subcutaneously or intravenously
Cattle & Buffalo : 100 - 350 ml
Calf, Goat & Sheep : 25 - 50 ml

Or as directed by the registered veterinarian

Warning/precautions:

- Solution should be warmed to body temperature and administered slowly.
- Besides milk fever if some other fever persists due to infection, procaine penicillin should not be given within 3 days after Caldex Vet injection.
- For intravenous infusion administer slowly sometime with interval 20 second.

Storage:

Store in a cool & dry place protected from light.
Keep all medicine out of reach of children.

Presentation:

100 ml & 250 ml in glass bottle.

For veterinary use only

Manufactured by :



POPULAR
POPULAR PHARMACEUTICALS LTD.
Agrovet Division
Tongi, Gazipur, Bangladesh

ক্যালডেক্স ভেট

ইনজেকটেবল সলিউশন

উপাদান:

প্রতি মি.লি.-তে আছে		
ক্যালসিয়াম গ্লুকোনট	বিপি	২০৮ মি.গ্রা.
ম্যাগনেসিয়াম হাইপোফসফাইট	ফার্মা গ্রোড	৫০ মি.গ্রা.
ডেক্সট্রোজ	বিপি	২০০ মি.গ্রা.
বোরিক এসিড	বিপি	৪২ মি.গ্রা.

ব্যবহার ক্ষেত্র:

গবাদি পশুতে দুধ জ্বরের চিকিৎসায় ও হাইপোক্যালসিমিয়া, হাইপোম্যাগনেসিমিয়া, হাইপোফসফটেমিয়া ও হাইপোগ্লাইসিমিয়া চিকিৎসায় ব্যবহার্য। কিটোসিসের চিকিৎসায় ও ব্যবহার্য।

মাত্রা ও প্রয়োগবিধি:

ক্যালডেক্স ভেট ধীরে ধীরে চামড়ার নীচে অথবা শিরায় ইনজেকশন প্রয়োগ করতে হবে।

গরু ও মহিষ : ১০০ - ৩৫০ মি.লি.

বাহুর, ছাগল ও ভেড়া : ২৫ - ৫০ মি.লি.

অথবা রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার্য।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ও সাবধানতা:

- ভায়াল হালকা গরম পানিতে রেখে দ্রবণের তাপমাত্রা শরীরের তাপমাত্রায় এনে ধীরে ধীরে ইনজেকশন দিতে হবে।
- দুধ জ্বরের সাথে অন্য কোন সংক্রমনজনিত জ্বর থাকলে ও ক্যালডেক্স ভেট ইনজেকশন দেয়ার ৩ দিনের মধ্যে প্রোকেন পেনিসিলিন ইনজেকশন ব্যবহার করা উচিত নয়।
- শিরায় ইনজেকশন প্রদানের সময় মাঝে মাঝে ২০ সেকেন্ড সময়ের জন্য বন্ধ রেখে পুনরায় চালু করতে হবে।

সংরক্ষণ:

ঠান্ডা ও শুষ্ক স্থানে, আলো থেকে দূরে রাখুন।
সকল ওষুধ শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

সরবরাহ:

১০০ মি.লি. ও ২৫০ মি.লি. গ্লাস বোতল।

শুধু ভেটেরিনারি চিকিৎসায় ব্যবহার্য।

প্রস্তুতকারক:



POPULAR
পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিঃ
এগ্রোভেট ডিভিশন
টংগী, গাজীপুর, বাংলাদেশ